

También puedes acudir al  
**Consejo Estatal Contra las Adicciones**  
 Dirección: **Independencia #97, Col. Centro, Querétaro, Qro.**  
 Teléfonos: 442 212 04 08 y/o 442 212 02 36

Redes sociales: Facebook, Instagram, X y TikTok  
**@CECAQRO | [www.cecaqueretaro.gob.mx](http://www.cecaqueretaro.gob.mx)**  
 Correo electrónico: [cecaadicciones@queretaro.gob.mx](mailto:cecaadicciones@queretaro.gob.mx)

**Todos los servicios son sin costo.**

**Línea de la vida:**  
**800 911 2000**

**#CONTIGO** Prevenimos adicciones y cuidamos la salud mental




“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



**PROGRAMA DE GOBIERNO DEL ESTADO**

**CONTIGO**

TODOS AVANZAMOS



Hablemos de:  
**FENTANILO**

**PODEMOS AYUDARTE EN EL TRATAMIENTO**

**#CONTIGO** cuidamos la salud mental

## ¿Qué es el Fentanilo?

Es un fuerte analgésico opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.

El fentanilo y otros opioides sintéticos son las drogas más frecuentemente relacionadas con las muertes por sobredosis.

El fentanilo ilegal se mezcla con otras drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y MDMA; esto es especialmente peligroso porque quien consume esas drogas por lo común no sabe que se les ha agregado fentanilo.

El fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones.

En algunas personas desde los primeros consumos puede provocar dependencia o adicción.

Su consumo puede causar un paro respiratorio, pérdida del conocimiento, coma y muerte por sobredosis.

En su forma recetada se utiliza para calmar el dolor, pero el fentanilo también se produce ilegalmente y se distribuye como droga callejera.



## ¿Cuáles son los síntomas?

La alta potencia del fentanilo aumenta tremendamente el riesgo de sobredosis, especialmente si la persona que consume drogas no sabe que el polvo o la pastilla que usa contiene fentanilo. Puede subestimar la dosis de opioides que está tomando y sufrir una sobredosis; toma en cuenta lo siguiente:

- Felicidad extrema
- Aletargamiento
- Náuseas, confusión
- Estreñimiento
- Cuerpo adormecido
- Necesidad creciente de consumir
- Depresión respiratoria o paro respiratorio
- Pérdida del conocimiento, coma.
- Muerte.

Las personas adictas al fentanilo que dejan de consumirlo pueden experimentar varios síntomas de abstinencia que a veces comienzan apenas unas pocas horas después de haber consumido la droga por última vez.

### Síntomas al dejar de consumir:

- Dolores en músculos y huesos.
- Problemas para dormir.
- Diarrea y vómitos.
- Escalofríos con "piel de gallina".
- Movimientos incontrolables.
- Deseos intensos de consumir la droga.

